

GYNELASE™

Gynelase™,
solution d'avant-garde
pour le traitement intime féminin :

- Verrues Génitales
- Lichen scléroatrofique
- Syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM)
- Labiaplastie



Contre-indications générales : Infection bactérienne ou virale. Grossesse et allaitement. Altérations du système immunitaire. Cicatrices chéloïdiennes antérieures. Prise d'isotrétinoïne au cours des 12 derniers mois. Sclérodémie Radiothérapie intensive. Brûlures dans la zone à traiter. Mauvaise guérison dans la zone à traiter. VIH. Néoplasie.

Contre-indications gynécologiques : Infections des voies urinaires aiguës ou récurrentes. Saignement, infection ou inflammation dans la zone à traiter. Grossesse (relative). Patients chez lesquels on a diagnostiqué une vessie neurogène, une malformation des voies urinaires et une pathologie organique de la vessie, un traitement affectant la dynamique vésico-fintériene. Histologie indiquant une tumeur maligne. Ne pas utiliser le système laser fractionnel pour la néoplasie. Une biopsie doit être effectuée en cas de blessure suspecte. Femmes avec score POPQ (système de quantification de prolapsus des organes pelviens de stade II), tumeur maligne actuelle, dysplasie cervicale.

Effets Secondaires. Malaise. Saignement (excisional HG- ValN). Brûlures vaginales, cicatrices, douleurs pendant les rapports sexuels et douleurs récurrentes / chroniques.

Lisez attentivement les instructions de la notice d'utilisation.

CE DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE II B
EST UN PRODUIT DE SANTÉ RÉGLEMENTÉ QUI PORTE AU
TITRE DE CETTE RÉGLEMENTATION LE MARQUAGE CE.
LES INFORMATIONS PUBLIÉES SONT UNIQUEMENT
PROPOSÉES À TITRE INDICATIF ET NE REMPLACENT PAS
UNE CONSULTATION CHEZ UN MÉDECIN.



DISTRILASER

L'EXCELLENCE MÉDICALE À VOTRE SERVICE

636 AVENUE DU 8 MAI 1945
83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
CONTACT@DISTRILASER.COM
WWW.DISTRILASER.COM



Dispositifs homologués pour usage professionnel uniquement.
Copyright © Distrilaser 2020. Toutes les marques citées sont des marques déposées.
Les logos, photos et visuels appartiennent aux marques respectives.
Tous droits réservés. Textes, photos et visuels non contractuels.

Aucun des traitements Gynelase™
n'est pris en charge par l'assurance maladie.



CRÉATION : www.lencrenoire.com - IMAGE : InterMedic - AdobeStock

Fabriqué par
INTERmedic
LASER & LIGHT SOLUTIONS



DISTRILASER

L'EXCELLENCE MÉDICALE À VOTRE SERVICE

GYNELASE™


RETROUVEZ VOTRE BIEN-ÊTRE INTIME

**GYNELASE™ : TRAITEMENT LASER
POUR LA ZONE INTIME DES FEMMES**

www.distrilaser.com



Voir notice d'utilisation



Gynelase™ est un dispositif médical certifié



EN QUOI CONSISTE LE TRAITEMENT ?

L'énergie laser est diffusée de manière fractionnée, sous forme de micro-impacts d'énergie séparés par du tissu sain.

Le laser **GYNELASE™** chauffe l'intérieur du vagin de façon fractionnée, en alternant des micro-zones d'impact du laser avec des espaces de tissu intact.

LE LASER GYNÉCOLOGIQUE GYNELASE™

Le laser CO2 est utilisé depuis plusieurs décennies en gynécologie pour traiter différentes pathologies, couper, coaguler et vaporiser les tissus. L'évolution des nouveaux lasers au CO2, tels que Gynelase™, a permis un contrôle parfait en plus de la manipulation facile des traitements non invasifs par des orifices naturels.

12. Kaplan et al. "The CO2 laser a versatile surgical modality".
13. Wright Cecil. "Laser surgery: using the carbon dioxide laser" Review. 29. Lee, 'Fractional carbon dioxide laser in re-calcitrant vulval lichen sclerosus Australasian Journal of Dermatology (2016) 57, 39-43' Australia. 36. Gonzalez Pablo et al. "Long-term effect of thermoablative fractional CO2 laser treatment as a novel approach to urinary incontinence management in women with genitourinary syndrome of menopause". Int Urogynecol J DOI 10.1007/s00192-017-3352-1. 41. Escribano et al "Tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia mediante láser fraccionado CO2: una opción terapéutica emergente" rev chil obstet ginecol 2016; 81(2): 138 - 151.

Verrues Génitales (12)

Le condylome est une maladie sexuellement transmissible causée par le virus du papillome humain, une incidence élevée de nos jours. Le laser CO2 est un traitement alternatif pour l'élimination des verrues génitales. Grâce à la vaporisation du tissu, les condylomes acuminés peuvent être traités dans différentes zones telles que la vulve, le vagin et la région périnéale.

Lichen scléroatrophique (29)

Une affection rare de la peau et des muqueuses vaginales qui se manifeste généralement par une inflammation chronique. Ils sont généralement traités aux stéroïdes. Cependant, un grand nombre de patients y résistent et un traitement alternatif qui s'est avéré efficace est le laser CO2.

Syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM) (36, 41)

En raison du manque d'œstrogènes pendant la ménopause, des modifications de la muqueuse vaginale entraînent un amincissement de l'épithélium, une diminution de la lubrification, entre autres. Ces changements entraînent une sensation de sécheresse, de brûlure et d'irritation. Le laser CO2 est un traitement alternatif pour le GSM, qui n'a pas d'indication chirurgicale, à une contre-indication à la chirurgie ou ne veut pas de procédure invasive.

Labioplastie (13)

La labioplastie est une intervention chirurgicale destinée à corriger les asymétries généralement dues à l'hypertrophie des grandes lèvres. Pendant des décennies, ces procédures ont été effectuées par des techniques chirurgicales conventionnelles. Cependant, le laser CO2 est un outil alternatif à ces techniques qui, par l'application d'énergie thermique, permet de faire une incision capable de couper et de coaguler le tissu en même temps.